

<b>5.4.3 Herbizide</b>		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungs- häufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
<b>Alekto Plus TF</b> (Glyphosat 450 g/l) 027385-00 ► 15.12.2023	einkeimbl. + zwei- keimbl.	4	4,0	1/1	Frühjahr bis Sommer	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	SF245-02, SS206	GHS 09	Blatt- herbizid	
<b>Alekto TF</b> (Glyphosat 360 g/l) 008270-00 ► 15.12.2023	einkeimbl. + zwei- keimbl.	4	5,0	1/1	Frühjahr bis Sommer	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	SF245-02, SS206	GHS 09	Blatt- herbizid	
<b>(G)BELOUKHA</b> (Pelargonsäure 680 g/l) 008528-00 31.08.2023	Stocktriebe (in Junganlagen Pflanzjahr bis 4. Standjahr)		16	2/2	Anfang Früh- jahr bis Ende Sommer	F	B4	<b>NT109, NW468, NW642-1 (5*)</b>	SS245-02, SS206, <b>SE110, SS110-1, SS2101</b>	GHS 07	Blatt- herbizid	
<b>Boom effekt</b> (Glyphosat 360 g/l) 006763-00 ► 15.12.2023	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenom- men Acker- Winde	4	5,0	2/2 im Ab- stand von 3 Monaten	während der Vegetations- periode	30	B4	<b>NG352, NG402, NT101, NW468, NW642 (5*)</b>	SF245-01		Blatt- herbizid	
<b>CHIKARA</b> (Flazasulfuron 250 g/kg) 034837-00 ► 31.07.2033	einkeimbl. + zwei- keimbl.		0,2	1/1	April-Juni Reihenbe- handlung	90	B4	<b>NG405, NG720, NT102, NW470, NW706, NW607- 1 (50%:15m, 75%: 10m, 90%:5*)</b>	SF245-02, <b>SF275-VEWE,</b> SS206, <b>SS2251</b>	GHS 09	Boden- u. Blatt- herbizid	
<b>Clinic TF</b> (Glyphosat 360 g/l) 006281-00 ► 31.12.2023	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenom- men Acker- Winde	4	5,0	2/2 im Ab- stand von 3 Monaten	während der Vegetations- periode	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)</b>	SF245-01	GHS 09	Blatther- bizid	
<b>Durano</b> (Glyphosat 360 g/l) 072389-00 ► 15.12.2023	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenom- men Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Ab- stand von 3 Monaten	Frühjahr und Sommer	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-EEWE,</b> SF245-02, SS206	GHS 09	Blatther- bizid	

<b>5.4.3 Herbizide</b>		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungs- häufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
<b>Glyfos TF Classic (A)</b> (Glyphosat 360 g/l) 024162-00 ► 15.12.2021 <b>Aufbrauchfrist 15.06.2023</b>	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	Frühjahr und Sommer	30	B4	<b>NG352, NT101, NW468, NW642-1 (5*)</b>	SF245-01	GHS 09	Blattherbizid	
<b>Glyfos Dakar</b> (Glyphosat 680 g/kg) 025937-00 ► 15.12.2023	ein- + zweikeimbl., ausgen. Acker-Winde	4	2,65	2/2 im Abstand von 90 Tagen	während der Vegetationsperiode	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	SF245-02, <b>SS110-1, SS2101, SS2202, SS526</b>	GHS 07 09	Blattherbizid	
<b>Glyfos SUPREME (A)</b> (Glyphosat 450 g/l) 005924-00 ► 15.12.2021 <b>Aufbrauchfrist 15.06.2023</b>	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker-Winde	4	4,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	Frühjahr und Sommer	30	B4	<b>NG352, NT102, NW468, NW642 (5*)</b>	SF245-01	-	Blattherbizid	
<b>Kerb FLO</b> (Propyzamid 400 g/l) 006220-00 ► 31.01.2024	einkeimbl. Unkräuter Vogel-Sternmiere Vegetationsruhe	2	6,25	1/1	Winter	F	B4	<b>NT103, NW468, NW642 (5*), NW705</b>	SF245-01, SS110, SS120, SS210, SS220, SS610	GHS 08	Bodenherbizid	
<b>(G)Nozomi</b> (Flumioxazin 500 g/kg) 024895-00 ► 30.06.2024	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Junganlagen		0,6	1/1	Anfang Frühjahr bis Ende Sommer; Reihenbehandlung mit Abschirmung	F	B4	<b>NW470, NW642-1 (5*)</b>	<b>SS110-1, SS120-1, SS2101, SS206, SF245-02</b>	GHS 08 09	Bodenherbizid	
	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Tafeltrauben		0,6	1/1		F		<b>NW470, NW642-1 (5*)</b>				
<b>Quickdown</b> (Pyraflufen 24,2 g/l als Ethylester 26 g/l) 005693-00 31.01.2024	Stocktriebe, nur in Riesling und Dornfelder	3	0,4 in Misch. mit 1,0 l/ha Toil	2/2 im Abstand von mind. 10 Tagen	n. Austrieb und erneuten Austrieb bis 15 cm Trieblänge	F	B4	<b>NW468, NW642-1 (5*)</b>	SE110, SF245-01, SS110, SS2101	GHS 05 07 08 09	Blattherbizid	

<b>5.4.3 Herbizide</b>		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungs- häufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
<b>(G)RANGER</b> (Fluroxypyr 150 g/l + Triclo- pyr 150 g/l) 007003-00 ► 15.12.2025	Abtötung von Wur- zelschossern BBCH 01-91, nach der Rodung und bei er- neutem Austrieb		20% in mind. 2 ml Wasser/ Stamm	1/1	streichen, Einzelpflan- zen-/Stamm- behandlung	F	B4	<b>NW468, NW642- 1 (5*)</b>	SF245-01, SE110, SE120, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS620	GHS 07 08 09	Blatther- bizid	
			0,4 ml pro Stamm	1/1	injizieren, Einzelpflan- zen-/Stamm- behandlung	F						
	Weinrebe, zur Rodung vorgesehen		20% in mind. 2 ml Wasser/ Stamm	1/1	streichen, Einzelpflan- zen-/Stamm- behandlung	F	B4	<b>NW468, NW642- 1 (5*)</b>	SF245-01, SE110, SE120, SS110, SS120, SS2101, SS2202	GHS 07 08 09	Blatther- bizid	
			0,4 ml pro Stamm	1/1	injizieren, Einzelpflan- zen-/Stamm- behandlung	F						
<b>Roundup PowerFlex</b> (Glyphosat 480 g/l) 006149-00 31.12.2023	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenom- men Acker- Winde	4	3,75	2/2 im Ab- stand von 3 Monaten	während der Vegetations- periode	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-EEWE,</b> SF245-02, SS206	GHS 09	Blatther- bizid	
<b>Roundup REKORD</b> (Glyphosat 720 g/kg) 007525-60 ► 31.12.2024	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenom- men Acker- Winde	4	2,5	2/2 im Ab- stand von 3 Monaten		30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)</b>	SF245-01, SS110, SS2101	GHS 09	Blatther- bizid	
<b>Roundup Ultra</b> (Glyphosat 360 g/l) 044142-00 ► 15.12.2023	ein- + zweikeimbl., ausgen. Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Ab- stand von 3 Monaten	während der Vegetations- periode	30	B4	<b>NG352, NG404, NW470, NT103, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-28WE,</b> <b>SS110-1,</b> SF245-02, SS206	GHS 09	Blatther- bizid	

<b>5.4.3 Herbizide</b>		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungs- häufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
<b>Taifun forte</b> (Glyphosat 360 g/l) 044044-00 ► 15.12.2023	ein- + zweikeimbl., ausgen. Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Ab- stand von 90 Tagen	während der Vegetations- periode	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-EEWE,</b> SF245-02, SS206	GHS 09	Blatther- bizid	
<b>(G)Shark</b> (Carfentrazone 55,92 g/l) 005268-00 31.03.2024	Stocktriebe Spitzschirm, nur in wüchsigen Sorten (Grüner Silvaner, Mo- rio Muskat, Chardon- nay, Schwarzriesling und Burgundersorten)	3	1,0	1/1	nach Aus- trieb bis 15 cm Trieb- länge	F	B4	<b>NW468, NW605</b> (50%:5*, 75%:5*, 90%:5*), <b>NW606</b> (5*)	SE110, SF245- 01, SS110, SS210	GHS 07 09	Blatther- bizid	
		3	0,5	2/2 im Ab- stand von 14 Tage	nach Aus- trieb und er- neuten Aus- trieb bis 15 cm Trieb- länge							<b>NW468, NW609</b> (5*)