

### Neuerungen und Bewährtes

Pflanzenschutz in Getreide, Mais, Raps, Rüben

2024



# Kaum (wirklich) neue Pflanzenschutzmittel für 2024

aber viele neue Namen

> auch wenn's schwer fällt, in Wirkstoffen "denken"

#### ANWENDUNGSBEDINGUNGEN GETREIDEHERBIZIDE DEMNÄCHST



- Frühzeitiger Herbizideinsatz (selten zu früh, oft zu spät!)
   bei noch kleinen Gräsern und Unkräutern
- Keine Aufwandmengenreduzierung
- Luftfeuchtigkeit > 60 %, Netzmittel zunehmende Bedeutung
- Feintropfige Applikation in den frühen Morgenstunden (hohe Luftfeuchtigkeit und windstill)
- Sulfonyle ohne FHS am besten mit AHL ausbringen
- Frühzeitige Wirkungskontrolle ca. 3-4 Wochen nach Anwendung
- Frühzeitige Nachbehandlung bei Minderwirkung

#### **ABSTAND HALTEN!**

## Rheinland Dfalz DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LÄNDLICHER RAUM (DLR) RHEINHESSEN-NAHEHUNSRÜCK

#### Nur Beispiele, keine aktuelle Liste

	Hang > 2 %	Saum mit 75 % Düse	Wasser mit 75 % Düse
Atlantis Flex	10	20	0
Atlantis WG	10	25	0
Atlantis OD	10	0	0
Husar OD	10	20	0
Husar Plus	0	5	0
Axial 50	0	0	0
Traxos	0	0	0
Concert SX	20	5	5
Broadway + FHS	0	0	0
Artus	0	0	0
Biathlon 4D + Dash	0	20	0
Dirigent SX	10	20	0
Pixxaro	20	20	5
Zypar	20	0	5

### In Wintergetreide Hauptproblem Ungräser, große Pflanzen, resistente Biotypen



- > Herbstmaßnahmen wahrnehmen
- > im Frühjahr

frühe Anwendung volle Aufwandmengen evtl. CTU zumischen evtl. Avoxa (Broadway + Axial Wirkstoffe)

### Wenn Atlantis, Broadway, Husar, Incelo und Co nicht mehr richtig wirken?









bei gleicher
Pinoxaden Menge
preisgleich
zu Axial 50

plus

Diko Florasulam "frei Haus"

50 g/l Pinoxaden

45 g/l Pinoxaden 5 g/l Florasulam

Axial Komplett 1 – 1,3 l/ha WW, WG, WR, Tri

39,40 €/1

35,60 €/1

### Wuchsstoff-Kombination in Winter- und Sommergetreide





**BBCH 13 - 31** 

360 g/l 2,4-D 90 g/l Fluroxypyr

entspricht

0,9 I/ha U46 D-Fluid und 0,5 I/ha 180er "Starane"

Disteln, Klette, Kreuzblüter Melden, Windenknöterich

#### Getreidefungizid





#### **Fungizid**

#### Kurzcharakteristik

Azol-, Strobilurin- und Morpholin-Kombination für alle Getreidearten (außer Hafer).

Pfl.Reg.Nr. 4332

Wirkstoffe

Prothioconazol 93,3 g/l
Trifloxystrobin 80 g/l
Spiroxamin 107 g/l

Wirkmechanismus

FRAC Gruppe 3, 11, 5

#### **Empfohlene Aufwandmenge**

1 I/ha zur zeitigen, infektionsnahen Blattbehandlung

1,25 I/ha zur Abschlussbehandlung bzw.

1,5 I/ha im Weizen zur Blüte gegen Ährenfusariosen

#### Anwendungszeitraum

Infektionsnah vom Spritzstart (mit Herbizid oder Wuchsregler) bis zur Abschlussbehandlung

Formulierung

EC, Leafshield

Gewässerabstand

10/5/5/5m

Gebindegrößen

51, 151

Input Classic

Prothioconazol

Spiroxamine

160 g/l


300 g/l

Trifloxystrobin seit 1999 seit 2003 in Deutschland

#### Getreidefungizid







## Das Azol "Revysol" = Mefentrifluconazol



#### **REVYLUTION?**

Balaya	1,5	Revysol F500	100 g/l 100 g/l
Revytrex	1,125 - 1,5	Revysol Xemium	66,7 g/l 66,7 g/l
Revytrex + Comet	1,1 - 1,5 + 0,35 - 0,5	Revysol Xemium F500	66,7 g/l 66,7 g/l 200 g/l
Revystar + Flexitiy	1,0 + 0,5	Revysol Metrafenone	100 g/l 300 g/l

#### Raps Standfestigkeit + Pilze



Mepiquat 114,43 g/l 21 g/l **Prohexadion** 

**Medax Top** 

F500 Strobilurin 100 g/l


**Architect + Turbo** Verhältniss 2:1



1,6 I/ha Architect® + Turbo

1,2 I/ha Architect® + Turbo

≈ 0,45 Medax Top



September/ Öktober

November

Dezember Februar

März

Mai

April

## Raps Cantus Gold > Cantus Ultra



Cantus Gold 0,5 I/ha

200 g/l Boscalid 200 g/l Dimoxystrobin



Cantus Ultra 0,8 I/ha

150 g/l Boscalid 250 g/l Pyraclostrobin







Zulassung endet am 31.07.2023 Abverkaufsfrist bis zum 31.01.2024 Aufbrauchfrist bis zum 31.07.2024

## Triflusulfuron "Debut" letztes Anwendungsjahr





#### "endokriner Disruptor"




30 g Debut 2 l Goltix

- > 15 g aktiver Wirkstoff
- > 1400 g aktiver Wirkstoff

## Herbizide Zukunftsmusik für unsere Rüben Rinskor mit dem Wirkstoff Florpyrauxifen







Zulassung wird erwartet

#### Herbizide Zukunftsmusik für unsere Rüben Rinskor mit dem Wirkstoff Florpyrauxifen



#### 25 g/l Rinskor

maximale Aufwandmenge 80 ml/ha

2 Anwendungen mit 2 x 1 g/ha aktiver Wirkstoff

3 Anwendungen mit 3 x 0,66 g/ha aktiver Wirkstoff


4 Anwendungen mit 4 x 0,5 g/ha aktiver Wirkstoff

vorwiegend blattaktiv vollsystemisch, Transport im Phloem und Xylem erste Symptome nach 8 – 12 Stunden

#### Herbizide Zukunftsmusik für unsere Rüben Rinskor mit dem Wirkstoff Florpyrauxifen



### Versuche Rinskor active Europa 2021–22






Zulassung wird erwartet

## Rübenmotte Notfallzulassung Coragen auch in 2024?



**BKS 40 % Befall** 

0,125 I/ha 300 - 800 I Wasser + Fließmittel




### Lumiposa, Cyantraniliprole insektizide, systemische Beize in Mais



#### Wirkung von Lumiposa gegen Drahtwurm

% Wirkung gegen Drahtwurm, n=44 europäische Versuche, 2015–2023



<sup>\*</sup> Neonicotinoide Beize in Deutschland nicht mehr zugelassen



#### Spintor GR, Spinosad Saatrillenbehandlung, Kontakt- Fraßwirkung



HUNSRÜCK

Spintor GR - Produktprofil

Bio-Landbau

Spintor<sup>™</sup>GR Qalcova active INSEKTIZID





	2018/849
Wirkstoff	Qalcova active (Spinosad) 0,4% (4 g/kg)
IRAC Gruppe	5 - Spinosyne
Formulierung	Mikrogranulat (GR)
Kulturen	Mais, Zuckermais, Kartoffel
Schadorganismus	Schnellkäfer (Drahtwurm, Agriotes sp.) Erläuterung: Zur Befallsminderung bei schwachem und mittlerem Befall
Aufwandmenge	12 kg/ha, 1 Anwendung pro Jahr
Anwendung	Ausbringung: Anwendung bei der Saat (Mais, Zuckermais) bzw. beim Legen (Kartoffel) Ausbringtechnik Mais: Mikrogranulatstreuer als Saatrillenbehandlung mit Erdabdeckung (OHNE Fishtail-Schar) Ausbringtechnik Kartoffel: Mikrogranulatstreuer mit Fishtail-Schar oder einem QDC DXP-L Diffusor als Furchenbehandlung mit Erdabdeckung
Zugelassen bis	30. April 2024
Zulassungsinhaber	SBM Développement SAS, Frankreich
Gebindegröße	12 kg Sack
Pflanzenschutzmittel vor	rsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnninweise und -symbole beachten.



## Systiva Carboxamid Beize in Weizen, Roggen, Gerste



Indikationen mit 75 – 150 ml/dt 333 g/l Fluxapyroxad (Xemium)

Winter + Sommergerste

Winterweizen

Winterroggen



Netzflecken, Rhynchosporium,

Mehltau, Streifenkrankheit,

**Schneeschimmel** 

Mehltau, Septoria,

**Schneeschimmel** 

Rhynchosporium, Schneeschimmel

**BASF:** 

"kann T1 Behandlung ersparen"

aber > keine Carboxamid Folgebehandlungen (Resistenz)

### Metolachlor > Verkauf + Anwendung endet am 23. Juli 2024



#### enthalten in:

Dual Gold, Gardo Gold, Zintan Gold, Elumis Gold, Callisto P Dual, Elumis P Dual

#### **Metolachlor**





#### **Dimethenamid**



### Metolachlor > Verkauf + Anwendung endet am 23. Juli 2024





je Liter 24 €/ha



je Liter 38 €/ha



38 €/ha



54 €/ha

#### Neuer, blattaktiver Laudis Pack





überwiegend blattaktiv

> Hirsen und Unkräuter müssen aufgelaufen sein

Laudis Plus Pack
Laudis + Delion
2 I/ha Laudis + 0,4 I/ha Delion

0,4 Delion = 275 g Mais Banvel WG

44 g/l Tembotrione 22 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 480 g/l Dicamba


#### **Aktuelle Infos zum Handlungsbedarf**



#### WhatsApp Gruppen Firmen unabhängiger Berater

**ISIP** 

- > tagesaktuelle Meldungen
- > Prognose Modelle, Halmbruch + Septoria
- > Getreide Monitoring



#### N aus der Luft Revolution, Innovation?



Methylobacterium symbioense

Luft N2 > Pflanzen NO4
Blattapplikation zu Beginn
der N-Hauptaufnahme Phase

bis zu 25 % des N-Bedarfs über N-Fixierung aus der Luft


ha-Preis ? 35 - 40 € /ha ?





**Utrisha**<sup>™</sup>N

NUTRIENT EFFICIENCY



and controlled way

#### Womit Mais beizen?




#### **Standard: Fungizider Beizschutz**

Biostimulanzien und Nährstoffcocktails in Versuchen nicht überall eindeutig positive Effekte.

#### **Empfehlung**

- > Force
- > Korit
- > Lumiposa







#### Was tun gegen Krähen?





Hallo, Habe heute morgen 20 Krähen erlegt. Wenn jemand abholen will um einzufrieren für Aussaat 22. Gerne melden.

08:31



Gurxi 200 Stück Federn Schwarz Federn Schwarz Basteln Federn Schwarz Natürliche Federn Schwarz DIY Federn Schwarz Federn Schwarz...


**★★★☆** ~ 36

13,99€




#### Neu in 2024 auf ISIP Meldeportal für Vogelschäden





#### Anmeldung Meldeportal Vogelschäden



#### Stand Maiswurzelbohrer





## Terbuthylazin (TBA) nur noch alle 3 Jahre



## Neue Anwendungsbestimmungen für Terbuthylazin ab dem 14.12.2021

Zur Eingrenzung maximaler Aufwandmenge von **Terbuthylazin (TBA)** belegt das BVL alle TBA-haltigen Pflanzenschutzmittel mit der Anwendungsbestimmung "**NG362**":

1)

Eine einzige Anwendung mit einer maximalen Dosis von 850 g TBA je Hektar innerhalb von drei Jahren auf der selben Fläche

2

Der Dreijahreszeitraum gilt rückwirkend und nicht erst ab dem Wirksamwerden der neu erteilten Anwendungsbestimmung

3)

TBA-haltige Herbizide mit alter Etikettierung, die sich bereits beim Anwender befinden, sind ebenfalls davon betroffen

## Noch Ungräser oder Unkraut **W** in Raps zu bekämpfen ?




Ungräser Propyzamid "Kerb"

falls verfügbar

Unkräuter Korvetto

### Gelbschalen! Lupe! Gegner erkennen!















### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit