Versuchsergebnisse aus Bayern

2006

Versuch zur Reduzierung der PVY-Infektion in Pflanzkartoffeln

Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Landwirtschaft und Forsten

Versuch zur Reduzierung der PVY-Infektion in Pflanzkartoffeln (RPL 824)

Versuchsplan	3
Standortbeschreibung.....	4
Ertragsdaten und Virusbefall.....	5
Y-Virusbefall 2003 bis 2006.....	6
Flugaktivität von Blattläusen	7
Kommentar.....	8

Versuchsfrage: Versuch zur Reduzierung der PVY-Infektion in Pflanzkartoffeln

Versuchsplan 2006

VG Behandlung	Aufwandmenge	Termin	Bemerkungen
1 Unbehandelt N-Düngung ortsüblich			Kontrolle
2 3x Pyrethroid 2x Tamaron 1-3x Tamaron + Karate Zeon (Tankmischung) N-Düngung ortsüblich	1.0 l/ha 0.5 l+0.05 l/ha	erste 3 Behandlungen zwei Folgebehandlungen sommerlicher Blattlausflug	Spritzabstand 7 Tage Spritzabstand 14 Tage Spritzabstand 14 Tage
3 Monceren G Spritzbehandlungen bis 7 Wochen nach Feld- aufgang nur bei starkem Blattlausflug nach der 7. Woche wie VG 2 N-Düngung ortsüblich	2.0 l/ha	Pflanzgutinkrustierung	
4 Thymian Extrakt N-Düngung ortsüblich			
5 N-Düngung reduziert keine Insektizide		max. 80 kg N/ha inklusive Nmin	
6 N-Düngung reduziert Spritzbehandlungen wie VG 2		max. 80 kg N/ha inklusive Nmin	
7 N-Düngung reduziert Monceren G Spritzbehandlungen wie VG 3	2.0 l/ha	max. 80 kg N/ha inklusive Nmin Pflanzgutinkrustierung	
8 N-Düngung reduziert Thymian Extrakt		max. 80 kg N/ha inklusive Nmin	

Standortübersicht

	Diepoltshof	Mötzing	Geisingen-Aulfingen
Versuchsstandort :	Diepoltshof	Mötzing	Geisingen-Aulfingen
Versuchsansteller:	ALF Regensburg	ALF Regensburg	Saatbauamt Donaueschingen
Bodenart:	IS	L	uL
Ackerzahl:	38	86	k.A.
Höhe über NN in m:	440	340	k.A.
Jahres-Ø-temperatur in °C:	7.6	7.9	k.A.
jährliche Niederschlagshöhe in mm:	780	656	k.A.
nächstgelegene Wetterstation Nr.:	107	18	k.A.
Sorte:	Quarta	Agria	Quarta
N Düngung in kg/ha:	VG 1-4: 75; VG 5-8: 25	VG 1-4: 60; VG 5-8: 15	k.A.
P ₂ O ₅ Düngung in kg/ha:	keine Angabe	15	k.A.
K ₂ O Düngung in kg/ha:	keine Angabe	21	k.A.
Verwendete Herbizide in E/ha:	3.5 l/ha Boxer + 0.4 kg/ha Sencor WG	1.0 l/ha Bandur+2.0 l/ha Boxer +0.5 kg/ha Sencor WG	k.A.
Pflanztermin:	09.05.06	02.05.06	20.04.06
Ausgangsbefall:	0% Y-Virus; 0% BR-Virus	0% Y-Virus; 0% BR-Virus	3% Y-Virus
Blattlausflugbeginn:	Mitte Mai	Mitte Mai	Anfang Mai
Erntetermin:	01.09.06	05.09.06	keine Beerntung
Zahl der Versuchsglieder:	8	8	3
Parzellengröße in m ² :	375	288	600
Erntefläche in m ² :	10	10	---

Einfluss von Maßnahmen zur Reduzierung des Virusbefalls auf den Ertrag von Kartoffeln 2006

Standort:		Diepoltshof					Mötzing					Geisingen - Auflingen		
Sorte:		Quarta					Agria					Quarta		
Ausgangsbefall:			0%		0%			0%		0%		3%		
VG	Variante	Ertrag dt/ha*	Y-Virusbefall %		BR-Virusbefall %		Ertrag dt/ha*	Y-Virusbefall %		BR-Virusbefall %		Y-Virusbefall %		
N-Düngung ortsüblich			MIN /MAX		MIN /MAX					MIN /MAX		MIN /MAX		
1	Unbehandelt	150 A	13.8 A	(6/23)	0.0 A	(0/0)	236 AB	0.3 A	(0/1)	1.5 A	(0/3)	48.7 A	30/61	
2	8 x Insektizid	120 A	11.0 A	(8/13)	0.0 A	(0/0)	231 AB	0.0 A	(0/0)	0.0 A	(0/0)	40.9 A	27/56	
3	Monceren G +2-6 x Insektizid	116 A	14.0 A	(10/23)	0.0 A	(0/1)	261 A	1.0 A	(0/2)	0.5 A	(0/2)	n.a.		
4	Thymian-Extrakt	118 A	13.0 A	(9/18)	0.0 A	(0/0)	156 C	0.3 A	(0/2)	1.0 A	(0/2)	41.5 A	29/51	
N-Düngung reduziert														
5	Unbehandelt	203 A	15.3 A	(8/32)	0.5 A	(0/2)	238 AB	2.5 A	(0/9)	0.5 A	(0/1)	n.a.		
6	8 x Insektizid	157 A	11.5 A	(7/16)	0.0 A	(0/0)	239 AB	1.0 A	(0/3)	1.0 A	(0/3)	n.a.		
7	Monceren G +2-6 x Insektizid	124 A	14.7 A	(9/19)	0.0 A	(0/1)	225 AB	4.0 A	(0/14)	0.0 A	(0/0)	n.a.		
8	Thymian-Extrakt	100 A	10.5 A	(6/14)	0.0 A	(0/0)	163 BC	2.0 A	(0/6)	0.0 A	(0/0)	n.a.		

* statistisches Verfahren für Ertragsdaten Student-Newman-Keuls

Statistik: Conover

Einfluss von Maßnahmen zur Reduzierung des Virusbefalls auf den Y-Virusbesatz von Kartoffeln von 2003 bis 2006

		Versuchsjahr:	2003	2004	2004	2005	2006	2006	2006
		Standort:	Lindenlohe	Wenigrötz	Konatsried	Diepoltshof	Diepoltshof	Mötzing	Geisingen-Aulfingen
		Sorte:	Saturna	Saturna	Saturna	Quarta	Quarta	Agria	Quarta
		Ausgangsbefall:	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%
		Y-Virusbefall in %							
VG	Variante								
N-Düngung ortsüblich									
1	Unbehandelt	11 a	9.5 a	0.5 c	9.8 a	13.8 a	0.3 a	48.7 A	
2	8 x Insektizid	15.8 a	11.5 a	7.5 ab	6.3 a	11 a	0 a	40.9 A	
3	Monceren G + 8 x Insektizid	---	8.5 a	---	---	---	---	---	
4	Monceren G + 3 x Insektizid	8.8 a	---	2.5 bc	9.3 a	14 a	1 a	---	
5	Thymian-Extrakt	---	7.5 a	---	11.5 a	13 a	0.3 a	41.5 A	
N-Düngung reduziert									
6	Unbehandelt	---	8 a	10 a	9 a	15 a	3 a	---	
7	8 x Insektizid	---	9 a	5.5 abc	10.8 a	11.5 a	1 a	---	
8	Monceren G + 8 x Insektizid	---	7.5 a	---	---	---	---	---	
9	Monceren G + 3 x Insektizid	---	---	6.5 abc	8.0 a	14.7 a	4 a	---	
10	Thymian-Extrakt	---	7 a	---	12.0 a	10.5 a	2 a	---	

Flugaktivität von Blattläusen (Durchschnittliche Gelbschalenfänge in Südbayern)

— 2004 —◆— 2005 -■- 2006 -●- Ø 1994 - 2006

Mittlere Gefährdung des Standortes

Der Versuchsstandort Diepoltshof liegt im Erzeugungsgebiet „Oberpfälzer Hügelland“ auf einer Höhenlage von 450 m ü. NN. Klimatisch ist er durch das angrenzende Naabtal geprägt. Mötzing ist dem Erzeugungsgebiet Donautal zuzuordnen. Es liegt auf 340 m ü. NN und in Nachbarschaft zu Sünching. Die relativ enge Verzahnung von Pflanz- und Konsumkartoffeln bedeutet für beide Standorte ein mittleres Gefährdungsniveau durch Kartoffelvirose.

Während empfindlicher Jugendphase starker Blattlausflug in Diepoltshof

Wegen der späten Pflanzung Anfang Mai liefen beide Bestände erst in der 1. Junihälfte auf. Damit blieben sie vom hohen Blattlausflug Mitte Mai unberührt.

In Mötzing bewegte sich der Blattlausflug während der ganzen Vegetationsperiode auf einem niedrigen Niveau. Ganz anders war die Lage in Diepoltshof. Hier herrschte im Juni, also in den ersten 4 Wochen nach Feldaufgang, ein starker Blattlausflug.

Geringer Virusbefall in Mötzing

Der geringe Blattlausflug führte in Mötzing zu einem sehr geringen Befall sowohl mit dem Y- als auch dem Blattrollvirus. Die geringen Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten bei Virusbesatz, Ertrag, Sortierung und Stärke sind zufallsbedingt.

Kräftiger Y-Virusbefall in Diepoltshof

Bedingt durch den kräftigen Blattlausflug während der besonders empfindlichen Jugendphase und der wenig ausgeprägten Resistenz der angebauten Sorte Quarta gegen das Y-Virus lag der Befall mit 11 und 15 % Y-Virus recht hoch.

Keine Maßnahme führte zu einer zuverlässigen Senkung des Virusbesatzes, weder der 6-malige Insektizideinsatz (VG 2 und 6), noch die Beizung mit Monceren G (VG 3 und 7) oder der Einsatz von Thymianextrakt. Auch die Reduzierung der N-Düngung senkte den Befall nicht.

Ein Einfluss der Maßnahmen auf Ertrag, Sortierung und Stärkegehalt war nicht erkennbar. Dies gilt auch für die erniedrigte N-Düngung. Die starken Unterschiede beim Ertrag sind verursacht durch Trockenschäden und Bodenunterschiede. In Anbetracht von Kosten und Wirkung erscheinen alle Insektizidmaßnahmen fragwürdig.

Beratungsempfehlungen

- Der Insektizideinsatz bringt bei Y-Virus keine sicher kalkulierbaren, stabilen Erfolge.
- Beim Blattrollvirus sind dagegen deutlich bessere Insektizideffekte zu erwarten.
- Eine zurückhaltende N-Düngung ist in der Pflanzkartoffelerzeugung sehr empfehlenswert.
- Wichtig ist eine frühe und fortlaufende Bereinigung.
- Spätinfektionen sind durch reifefördernde Maßnahmen einzuschränken.

Quelle: ALF Regensburg