Rohproteingehalte in den LSV Ackerbohnen 2015

% RP bei 86% TS

t = tanninfreie Sorte, v = vicin- und convicinfreie Sorte

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Orte		Barlt	Loit	Hohen lieth	Linden hof Pflug	Linden hof Mulch	Futter kamp	Mittel 2015 6	Mittel 2014 6	Mittel 2013 4
Fuego		25,4	22,0	24,1	23,7	23,4	22,9	23,6	24,5	23,7
Isabell		26,5	24,0	25,4	26,0	25,3	24,5	25,3	25,6	24,6
Pyramid		25,3	20,3	22,8	23,7	23,1	21,8	22,8	24,5	24,5
Fanfare		25,8	23,6	24,8	24,5	24,9	23,7	24,5	25,2	26,7
Taifun	t	26,0	23,9	24,1	24,2	24,0	24,1	24,4	25,1	24,3
Boxer		25,1	23,4	24,0	23,8	23,6	23,5	23,9	-	-
Tiffany	v	27,0	25,2	26,4	26,3	26,1	25,2	26,0	-	-
Mittel		25,9	23,2	24,5	24,6	24,3	23,7	24,4	25,0	24,5
Min		25,1	20,3	22,8	23,7	23,1	21,8	22,8	24,5	23,4
Max		27,0	25,2	26,4	26,3	26,1	25,2	26,0	25,6	26,7
Spannw.		1,9	4,9	3,6	2,6	3,1	3,4	3,2	1,1	3,4

12.01.2016 Pflanzenbau / Dr. W. Sauermann