

Rohproteingehalte in den LSV Ackerbohnen 2016

% RP bei 86% TS

t = tanninfreie Sorte, v = vicin- und convicinfreie Sorte



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

	Barlt	Loit	Hohen lieth	Linden hof Pflug	Linden hof Mulch	Mittel 2016 5	Mittel 2015 6	Mittel 2014 6
Orte								
Fuego	27,4	25,7	28,9	28,1	26,9	27,4	23,6	24,5
Fanfare	26,7	26,7	28,3	28,7	27,0	27,5	24,5	25,2
Taifun t	25,9	27,0	28,8	27,6	26,8	27,2	24,4	25,1
Boxer	27,1	26,1	28,1	26,6	26,5	26,9	23,9	-
Tiffany v	27,0	28,0	28,9	28,1	25,4	27,5	26,0	-
Mittel	26,8	26,7	28,6	27,8	26,5	27,3	24,5	25,0
Min	25,9	25,7	28,1	26,6	25,4	26,9	23,6	24,5
Max	27,4	28,0	28,9	28,7	27,0	27,5	26,0	25,2
Spannw.	1,5	2,4	0,8	2,1	1,5	0,6	2,4	0,7

12.01.2017 Dr. C. Algermissen